SUPPLÉMENT MUG

Supplément pour l'isolation d'Escherichia coli.
Supplément pour l'isolation d'Escherichia coli.

MODE D'UTILISATION

Reconstituer aseptiquement le contenu d'une fiole avec 5 ml d'eau distillée stérile. Agiter jusqu'à dissolution complète, puis ajouter aseptiquement à 500 ml de MAC CONKEY AGAR (Code 610028-620028) ou VIOLET RED BILE LACTOSE AGAR (Code 610058-620058), après autoclave et refroidissement à 50°C. Pour les milieux sans colorants, la concentration finale suggérée est : 50 mg/l. Mélanger soigneusement et distribuer dans des boîtes de Pétri.

MODE D'EMPLOI

Reconstituer aseptiquement le contenu d'une fiole avec 5 ml d'eau distillée stérile. Agiter jusqu'à dissolution complète, puis ajouter aseptiquement à 500 ml de MAC CONKEY AGAR (Code 610028 - 620028) ou VIOLET RED BILE LACTOSE AGAR (Code 610058-620058), après autoclave et refroidissement à 50°C. Pour les milieux sans colorants, la concentration finale suggérée est : 50 mg/l. Mélanger soigneusement et distribuer dans des plats de pétri.

FORMULE (grammes par fiole)

Methylumbelliféril-β-D-glucuronide…….. 50 mg

FORMULE (grammes par fiole)

Methylumbelliféril-β-D-glucuronide…….. *50 mg*

CONTENU

10 fioles lyophilisées de supplément MUG

CONTENU

10 fioles lyophilisées de supplément MUG

CONSERVATION

5-12℃

STOCKER À

5-12℃

VALIDITÉ

3 années

DURÉE DE CONSERVATION

3 ans

PRODUIT / PRODUCT	CODE / CODE	EMBALLAGE / PACKAGING
SUPPLÉMENT MUG		10 Fiale pour 500 ml de milieu 10 flacons pour 500 ml de milieu
MAC CONKEY AGAR	610028	500 g
MAC CONKEY AGAR	620028	100 g
VIOLET RED BILE LACTOSE AGAR	610058	500 g
VIOLET RED BILE LACTOSE AGAR	620058	100 g

BIBLIOGRAPHIE

1. Hansen, W., et E. Yourassowsky. 1984. Détection de β-glucuronidase chez les membres fermentant le lactose de la famille enterobacteriaceae et sa présence dans les cultures d'urine bactériennes. J.Clin.Microbiol. 20:1177-1179